



Arzneimittelinformation

APO. Apotheke

Nr. 44
VerfasserIn Martina Courvoisier
Freigabe durch Verena Nägele, Claudia Schlup

Version 02
Erstellt am 03.11.2022
Gültig bis 02.11.2025

Teilbarkeit und Zermörserbarkeit / Sondengabe fester Arzneiformen

Inhalt

1 Allgemein	1
2 Hinweise zur Nutzung dieser Liste	1

1 Allgemein

Erhält ein Patient seine Medikamente über eine Ernährungssonde oder ist die Gabe einer halben Tablette verordnet, muss zunächst geprüft werden, ob eine Teilung, das Zermörsern (= Zerreiben in der Reibschale) oder Suspendieren möglich sind.

Angaben zur Teilbarkeit einer Tablette finden sich mitunter in der Fachinformation, während Informationen zur Sondengängigkeit in der Regel nicht zu finden sind.

Informationen zum Vorgehen bei der Verabreichung von Medikamenten über Sonde und grundsätzliche Anforderungen wie Sondenart (Durchmesser), Sondenlage, Arzneiform, CMR-Substanzen und Bioverfügbarkeit beachten: BPF.HA.025 (interne Weisung)


2 Hinweise zur Nutzung dieser Liste

Zer Kleinern




- **Z / S** = Arzneimittel kann zermörsert oder suspendiert werden.
- **(Z / S)** = Arzneimittel kann unter bestimmten Bedingungen zermörsert oder suspendiert werden
- **L** = Arzneimittel wird in Wasser aufgelöst
- **Kapsel öffnen und S** = Arzneimittel ist eine Kapsel. Die Kapselhälften auseinanderziehen und Inhalt in Wasser suspendieren
- **Keine** = Arzneimittel sollte nicht zermörsert oder gelöst werden

Teilbarkeit



- **Ja** = Arzneimittel kann zur Dosishalbierung geteilt werden
- **(Ja)** = Arzneimittel kann geteilt werden, allerdings nicht zur Dosishalbierung
- **Ja (10mg)** = Nur die angegebene Dosierung (hier: 10mg) kann geteilt werden
- **Nein** = Arzneimittel kann nicht geteilt werden

Sondengabe



- **Ja** = Arzneimittel darf zermörsert und über die Sonde gegeben werden
- **(Ja)** = Arzneimittel darf unter den gegebenen Bedingungen über die Sonde gegeben werden
- **Nein** = eine Sondengabe ist nicht möglich



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
ACIDUM FOLICUM Streuli Tabl (Folsäure)	Z / S	(Ja)	Ja		
ACIMETHIN Tabl Me- pha (Methionin)	(Z / S)	(Ja)	Ja	Dicke Filmmantelung, ein Abtrennen der Filmreste ist empfehlenswert. Wirkstoff ist licht- und oxidationsempfindlich	-
AKINETON Tabl (Biperiden)	Z / S	Ja	Ja	Tablette ist viertelbar. Die nüchterne Einnahme kann zu Magenbeschwerden führen.	AKINETON iv. (Biperiden) (nur parenterale Gabe)
AKYNZEO Kps (Palonosetron, Netupitant)	Keine	(Ja)	Ja	Kapsel öffnen: Kapselinhalt besteht aus 3 Tabletten (Netupitant) und einer Weichkapsel (Palonosetron). Bei Schluckproblemen können diese 4 Bestandteile einzeln eingenommen werden. Sondengabe: Tabletten (Netupitant) in Wasser lösen. Weichkapsel (Palonosetron) auf i.v. oder anderen Wirkstoff.	GRANISETRON InfKonz, EMEND (Aprepitant) Kapselinhalt suspendierbar, ONDANSETRON SchmelzTbl 4mg, PALONSETRON Inj Lös,
ALDACTONE Filmtabl (Spironolacton)	Z / S	(Ja)	Ja	CMR-Substanz. Film dient der Maskierung des bitteren Geschmacks. Tablette mörsern, in Glycerin aufnehmen und in Sirup verdünnen.	ALDACTONE InjLös 200mg/10ml (IMP D), SOLDACTONE Amp 200mg/2ml (nur parenterale Gabe)
AMIODARON Tbl Zen- tiva (Amiodaron)	Z / S	(Ja)	Ja	Wirkstoff ist lichtempfindlich.	AMIODARON InjLös 150mg/3ml
AMLODIPIN Tbl Pfizer (Amlodipin)	Z / S	Ja (5 mg)	Ja	Nur 5mg Tbl ist teilbar. Wirkstoff ist lichtempfindlich und schlecht wasserlöslich: sofort nach zermörsern aufschlänmen und verabreichen.	
AMOXICILLIN DISP Tabl Sandoz (Amoxicillin)	Z / S	(Ja)	Ja	Tabletten zermörsern (für feinere Suspension) oder direkt zerfallen lassen in Wasser und rasch applizieren.	AMOXICILLIN Gran 200 mg/4 ml Sandoz
ANTABUS Dispergetten (Disulfiram)	L	Ja	Ja	Tablette ist viertelbar. In einem Glas Wasser vollständig lösen. Es entsteht eine milchige, feine Dispersion, welche geschmacksneutral ist.	
APHENYLBARBIT Tabl Streuli (Phenobarbital)	Z / S	Ja	Ja	Nur 50mg und 100mg Tabl sind teilbar	PHENOBARBITAL 10% Amp (nur parenterale Gabe), PHENOBARBITAL Tropfen 1mg /gtt
ARICEPT Filmtabl (Donezepil)	Z / S	(Ja)	Ja	Wirkstoff bitter, für Sonde CH ≥8 geeignet	



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/ Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
ASPIRIN CARDIO Tabl (Acetylsalicylsäure)	Z / S	(Ja)	Ja	Gabe über Jejunalsonde nicht empfohlen. Magensaftresistenz geht beim Zermörsern verloren. Nach der Einnahme mind. ein Glas Wasser trinken. Wirkstoff ist hydrolyse- und oxidationsempfindlich (Essiggeruch).	ASPEGIC 500mg Sachets, ASPEGIC iv/im
ATARAX Tabl (Hydroxyzin)	Z / S	Ja	Ja		ATARAX Sirup 2 mg / ml
ATORVASTATIN Pfizer Tbl. (Atorvastatin)	Z / S	Ja (nicht: 10mg)	Ja	Wirkstoff lichtempfindlich; 10mg Tabl sind nicht teilbar	
AXURA Filmtabl (Memantin)	Z / S	Ja (10mg)	Ja		AXURA Lös 10 mg / g mit Dosierpumpe (10 mg = 20 gtt)
BACTRIM forte Tabl (Sulfamethoxazol und Trimethoprim)	Z / S	Ja	Ja	Suspension mit mind 50ml Wasser verdünnen (hohe Osmolarität kann zu Diarrhö führen). 1 Tbl entspr. 20ml Nopil Sirup	NOFIL Sirup, BACTRIM Inf Konz 400/80 mg
BECOZYM forte Drag (Vitamin B - Komplex)	Z / S	Nein	Ja	licht- und oxidationsempfindlich.	BEROCCA Brausetabl (zusätzlich mit Vit. C / Mg)
BENADON Tabl (Pyridoxin - Vit B6)	Z / S	Ja	Ja		BENADON InjLös Vial 300mg/2ml (Imp D)
BENERVA Tabl 300 (Thiamin - Vit B1)	Z / S	(Ja)	Ja	Starker Vit. B-Geruch. Ampulle kann 1:1 verdünnt und über Sonde gegeben werden.	BENERVA Inj Lös 100 mg Amp.
BETASERC Tabl (Betahistin)	Z / S	Ja (nicht: 8mg)	Ja	Wirkstoff ist lichtempfindlich. Tabl 8mg sind nicht teilbar	BETASERC Tropfen 8 mg / ml
BETNESOL Tabl (Betamethason)	L	Ja	Nein	Tablette direkt in Wasser lösen.	CELESTONE Inj Lös, DIPROPHOS Inj Lös (nur parenterale Gabe)
BETMIGA Ret Tabl (Mirabegron)	Keine	Nein	Nein	Retardwirkung geht verloren	KENTERA Matrixpfl. 3.9 mg / 24 h (Oxybutynin), SPASMO URGENIN Drgs (Trospium) mörsern / suspendieren.
BRILIQUE Filmtabl (Ticagrelor)	Z / S	(Ja)	Ja	Sonde ≥8 CH;	BRILIQUE 90 mg Schmelztabletten (in Wasser dispergieren)
BUSCOPAN Drag (Butylscopolamin)	Z / S	Nein	Ja	Wirkstoff sehr bitter (nur über Sonde verabreichen)	BUSCOPAN Supp oder Inj Lös (nur parenterale Gabe)



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
CALCIUMACETAT Kps Bichsel (Calcium acetat)	Kapsel öffnen und S	keine	Ja	Sonde nach der Gabe gut spülen, da Calcium mit Phosphat in der Sondennahrung komplexieren kann; nicht über Jejunalsonde verabreichen	
CARVEDILOL Tbl. Mepha (Carvedilol)	Z / S	Ja	Ja	Wirkstoff ist licht- und hydrolyseempfindlich	
CATAPRESAN Tabl (Clonidin)	Z / S	Ja	Ja	Ampulle p.o. nach Verdünnung mit mind 30ml Wasser	CATAPRESAN Inj Lös
CELLCEPT Kaps (Mycophenolat)	Keine	keine	Nein	CMR-Substanz. Kapsel nicht öffnen, Magensaftresistenz geht verloren	<i>CELLCEPT Susp 200 mg/ml, CELLCEPT i.v. Trockensub 500 mg</i>
CETIRIZIN Filmtabl Spirig (Cetirizin)	Z / S	Ja	Ja		CETALLERG Sandoz Tropfen 10 mg / ml
CIPROFLOXACIN Filmtabl Mepha (Ciprofloxacin)	Z / S	Ja	Ja	Gleichzeitige Gabe mit Sondennahrung, Antazida, Calcium, Eisen oder Zink verringert die Resorption.	CIPROFLOXACIN Inf Lös 200 mg / 100 ml Fresenius <i>CIPROXIN Susp</i>
CITALOPRAM Filmtabl Sandoz (Citalopram)	Z / S	Ja	Ja		<i>ESCITALOPRAM Tropfen oder Schmelztabletten, SEROPRAM InfKonz 40 mg/ml (IMP D)</i>
CLARITHROMYCIN Filmtabl Sandoz (Clarithromycin)	Z / S	(Ja)	Ja	Wirkstoff ist lichtempfindlich	CLARITHROMYCIN Susp 125 mg / 5 ml (bei Sondengabe verdünnen) CLARITHROMYCIN i.v. 500 mg
CLINDAMYCIN Kps Sandoz (Clindamycin)	Kapsel öffnen und S	Nein	Ja	Wirkstoff riecht unangenehm; zur Verhinderung einer Ösophagitis Kapsel mit ausreichend Wasser einnehmen	<i>CLINDAMYCIN Granulat, DALACIN C Granulat, CLINDAMYCINPHOSPHAT 600mg Sandoz i.v.</i>
CLOPIN eco Sandoz Tabl (Clozapin)	Z / S	Ja	Ja	Clopin 100mg Tbl ist viertelbar.	
CO AMOXI Mepha Lactbl (Amoxicillin, Clavulansäure)	Z / S	(Ja)	Ja	Schwer suspendierbar	CO AMOXI Pulver für Suspension 475 mg, CO AMOXI i.v. TS 550 mg, 1100 mg, 1200mg, 2200 mg CO AMOXI Disp Tabl



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
CO DAFALGAN Tabl (Paracetamol, Codein)	Z / S	(Ja)	Ja		CO DAFALGAN Bausetbl PARACETAMOL InfLös 500 mg oder 1000 mg/ 100ml (ohne Codein)
CODEIN Tabl Knoll (Codein)	Z / S	(Ja)	Ja		BENYLIN mit Codein Sirup, MAKATUSSIN Tropfen
COLCHICINE Ysat Tbl (Colchicine)	Z / S	(Ja)	Ja	CMR-Substanz. Lichtempfindlich.	
CONCOR Lacktabl (Bisoprolol)	Z / S	Ja	Ja	Wirkstoff bitter. Verstopfung der Sonde möglich.	ESMOLOL OrPha InjLös 100 mg / 10 ml (Esmolol)
CORVATON forte Tabl (Molsidomin)	Z / S	Ja	Ja	Wirkstoff lichtempfindlich	andere Vasodilatoren: DEPONIT Matrixpfl, Nitroglycerin (NITROLINGUAL Pumpspray, PERLINGANIT InfLös etc.)
CORVATON RETARD Tabl (Molsidomin)	Keine	Ja	Nein	Unretardierte Formulierung für Sondengabe verwenden.	CORVATON forte Tabl
COSAAR Filmtabl (Losartan)	Z / S	Ja (nicht: 100mg)	Ja	Wirkstoff mit unangenehmem Geschmack. Wirkstoff kann nach wiederholter Gabe Schleimhäute reizen.	
COSAAR PLUS Filmtabl (Losartan, Hydrochlorothiazid)	Z / S	(Ja)	Ja	Wirkstoff mit unangenehmem Geschmack. Wirkstoff kann nach wiederholter Gabe Schleimhäute reizen.	
CREON 25000 Kaps (Multienzyme)	Kapsel öffnen und S	Nein	Ja	Kapselinhalt mit Fruchtsaft, Joghurt oder Apfelmus verrühren (nicht mit Milch). Pellets dürfen nicht zerkaut werden; Magensonde: Magensaftresistente Pellets nicht mörsern, erfordert CH \geq 16 (Pellet \varnothing 0.6-1.6 mm); In ausreichend Wasser lösen, unmittelbar verabreichen und Sonde gut nachspülen. Jejunalsonde: Pellets dürfen zermörsern werden und vorzugsweise in Natriumbicarbonat 8.4 % suspendiert verabreichen (pH > 5.5 verbessert Löslichkeit der Pellets)	Mit PEPTAMEN HN ernähren; CREON MICRO (kleinere Pellets: leichter suspendierbar)
CYKLOKAPRON Filmtabl. (Tranexamsäure)	Z / S	(Ja)	Ja	Sondenapplikation ab CH \geq 13 möglich	CYKLOKAPRON Brausetbl 1 g, TRANEXAM i.v.



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/ Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
CYMBALTA Kaps mg (Duloxetine)	Kapsel öffnen und S	keine	Ja	Kapsel enthält magensaftresistente Pellets, die nicht zerkaut oder zermörsert werden dürfen. Kapselinhalt nur in saure Flüssigkeiten (Cola, Orangensaft) suspendiert und sofort verabreicht werden.	
CYTOTEC Tabl 200 mcg (Misoprostol)	Z / S	(Ja)	Ja	CMR-Substanz. Wirkstoff lichtempfindlich.	
DAFALGAN Tabl (Paracetamol)	Z / S	(Ja)	Ja		DAFALGAN Brausetabl, Supp, Sirup, ODIS Schmelztabl, BECETAMOL Tropfen PARACETAMOL i.v. 500mg oder 1000mg / 100 ml
DAFALGAN ODIS Schmelztabl (Paracetamol)	S	Nein	Ja	Schmilzt auf der Zunge. Tablette kann in Wasser gelöst werden.	DAFALGAN Brausetabl, Supp, Sirup, TYLENOL Kinder Supp
DANCOR Tabl (Nicorandil)	Z / S	Ja (10mg)	Nein	Nur 10mg Tbl ist teilbar. 20mg Tablette hat eine Zierrille	ILOMEDIN Inf Konz 20 mcg/ml (Iloprost: nicht identischer Wirkstoff!)
DAPSON-FATOL Tabl (Dapson)	Z / S	(Ja)	Ja		
DEROXAT Filmtabl (Paroxetin)	Z / S	Ja	Ja	CMR-Substanz. Filmtabl schwer suspendierbar: mörsern und in 10 ml Wasser suspendieren (Zerfall in Wasser möglich, dauert aber bis zu 30 min). Sondengrösse CH ≥ 12	DEROXAT Suspension
DEXAMETHASON Gal- epharm Tabl (Dexamethason)	Z / S	Ja	Ja	Wirkstoff ist bitter	MEPHAMESON InjLös 4 mg / ml und 8 mg / ml
DIAMICRON MR Tabl (Gliclazid)	Keine	Ja	Nein	Retardprinzip geht verloren beim Mörsern	Insulin
DIAMOX Tabl (Acetazolamid)	Z / S	Ja	Ja	Alternativen benutzen. Wirkstoff ist schleimhautreizend und kann Erbrechen hervorrufen	DIAMOX iv. 500 mg (nur parenterale Gabe)
DIBENZYRAN Kps (Phenoxybenzamin)	Kapsel öffnen und S	Nein	Ja	CMR-Substanz. zu einer Mahlzeit aufrecht sitzend mit reichlich Flüssigkeit einnehmen	
DIGOXIN Juvisé Tabl (Digoxin)	Z / S	(Ja)	Ja	Gefahr der Dosierungenauigkeit; Blutspiegelbestimmung empfohlen	DIGOXIN Juvisé Inj Lös 0.5 mg / 2 ml



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
DILZEM RETARD Filmtabletten (Diltiazem)	Keine	Nein	Nein	Retardprinzip geht verloren.	CLEVIPREX InjEmuls 0.5 mg / ml (anderer Wirkstoff: Clevidipin, parenteraler Calciumkanalblocker)
DIMAVAL (DMPS) Kapseln (Bis(sulfanyl)propan-1-sulfonsäure)	Kapseln öffnen und S	keine	Ja	Kapselinhalt in Wasser suspendieren. Nicht gleichzeitig mit Mineralstoffen einnehmen wegen Komplexbildung und dadurch Wirkverlust	
DIOVAN Filmtabletten (Valsartan)	Z / S	(Ja)	Ja		
DIPIPERON Tabletten (Pipamperon)	Z / S	Ja	Ja		HALDOL Tropfen 2 mg / ml (Haloperidol), HALDOL i.m. InjLös 5 mg / ml, DIPIPERON 20mg/5ml Sirup (Imp D)
DISTRANEURIN Kapseln (Clomethiazol)	Keine	Nein	Nein		<i>DISTRANEURIN Mixtur 300 ml (Imp D) (1 Ksp entspricht ca. 6 ml Mixtur)</i>
DORMICUM Tabletten (Midazolam)	Z / S	Ja	Ja		MIDAZOLAM Suspension, DORMICUM Amp (können iv / rektal verabreicht werden)
DOSTINEX Tabletten (Cabergolin)	Z / S	Ja	Ja		-
DULCOLAX Dragées (Bisacodyl)	keine	Nein	Nein	Magen- und dünndarmresistente Darreichungsform, Freisetzung erst im Kolon	DULCOLAX Supp 10 mg, LAXOBERON Tropfen (Natrium-picosulfat)
DUODART Kapseln (Tamsulosin, Dutasterid)	keine	Nein	Nein	CMR-Substanz. Kapsel enthält retardierte Pellets (Tamsulosin) und eine Weichgelatine-Kapsel (Dutasterid)	
EFIENT Tabletten (Prasugrel)	Z / S	(Ja)	Ja	Wirkstoff ist oxidations- und feuchtigkeitsempfindlich.	
ELEVIT PRONATAL FilmTabletten (Multivitamin)	Z / S	Ja	Ja	sehr schlecht löslich	SUPRADYN Brausetabletten
ELIQUIS FilmTabletten (Apixaban)	Z / S	(Ja)	Ja	Filmüberzug hat keine Funktion; Tabletten können zermörsert werden	
ELTROXIN LF (Levothyroxin)	Z / S	Ja (50µg)	Ja	Nüchtern einnehmen	L-THYROXIN TS cSolv 500 mcg (Imp D)



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
EMEND Kaps (Aprepitant)	Kapsel öffnen und S	keine	Ja	Arzneistoff liegt in der Kapsel als Mikropellets (Ø 1mm) vor, Mikropellets nicht zerstören	<i>IVEMEND Inj Lös 150 mg (Fosaprepitant)</i>
ENALAPRIL Tbl Mepha (Enalapril)	Z / S	Ja	Ja		
ENALAPRIL-HCT Tbl. Mepha (Enalapril, Hydrochlorothiazid)	Z / S	Ja	Ja		
ENTRESTO Filmtabl (Valsartan, Sacubitril)	Z / S	(Ja)	Ja		ACE-Hemmer der Sartan
ESIDREX Tabl (Hydrochlorothiazid)	Z / S	Ja	Ja		
ESOMEPRAZOL MUPS Tbl. (Esomeprazol)	S	(Ja)	Ja	Tablette enthält magensaftresistente Pellets. Gastralsonde: Tablette in Spritze geben, 20 - 25 ml Wasser aufziehen. Tablette zerfällt innert 2-3 min (milchig, erkennbare Mikropellets). Jeweils 5 ml Suspension applizieren und Spritze wieder schütteln; Sondendurchmesser CH ≥ 8 Jejunalsonde: Tablette darf zermörsert werden	ESOMEPR i.v. (nur parenterale Gabe) , NEXIUM Granulat (für Sondengabe zugelassen), PANTOZOL Granula (für Sondengabe zugelassen)
FLAGYL Tabl (Metronidazol)	Z / S	(Ja)	Ja		METRONIDAZOL i.v.
FLATULEX Kautabl (Simeticon)	Z / S	(Ja)	Ja		FLATULEX Tropfen
FLORINEF Tabl (Fludrocortison)	Z / S	Ja	Ja	CMR-Substanz	-
FLUCONAZOL Kps Mepha (Fluconazol)	Kapsel öffnen und S	keine	Ja		FLUCONAZOL i.v.
FORXIGA FilmTabl (Dapagliflozin)	Keine	nein	Nein		Insulin



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
FOSAVANCE Wochen-Tabl (Alendronat, Colecalciferol)	Z / S	(Ja)	Ja	Sondennahrung muss vor und nach der Gabe 30 Minuten ausgesetzt werden	<i>BINOSTO (Alendronat) Brausetabletten</i>
GABAPENTIN Kps Sandoz eco (Gabapentin)	Kapsel öffnen und S	Nein	Ja		
GLUCOPHAGE Filmtabletten (Metformin)	Z / S	(Ja)	Ja	Tabl 1000 mg teilbar in 2 Teile	Insulin
GUTRON Tabl (Midodrin)	Z / S	Ja	Ja		<i>GUTRON Tropfen 10 mg/ml</i>
HALCION Tabl (Triazolam)	Z / S	(Ja)	Ja	Tabl 0.25 mg, teilbar in 2 Teile	
HALDOL Tabl (Haloperidol)	Z / S	(Ja)	Ja	Wegen Gefahr, dass Sonde verstopft, besser Alternative verwenden	HALDOL Tropfen 2 mg/ml, Haldol Inj Lös 5 mg/ml
HYDROCORTISON Galepharm Tabl (Hydrocortison)	Z / S	Ja	Ja		SOLU-CORTEF Trockensubst. 500 mg c Solv 4 ml
IBUPROFEN Sandoz Filmtabletten (Ibuprofen)	Z / S	Ja	Ja		<i>SPEDIFEN Granulat oder IRFEN Junior Suspension</i>
IMUREK Filmtabletten (Azathioprin)	Z / S	(Ja)	Ja	CMR- Substanz (Immunmodulator)	<i>IMUREK i.v. (nur parenterale Gabe)</i>
INDERAL Tabl (Propranolol)	Z / S	(Ja)	Ja		<i>HEMANGIOL Lös 3.75 mg/ml (für Kinder). PROPRANOLOL HCL Suspension 5 mg/ml (Eigenprodukt Spitalapotheke), PROPRANOLOL HCl Lösung 1mg/ml</i>
IRFEN Lactab (Ibuprofen)	Z / S	(Ja)	Ja		SPEDIFEN Granulat oder IRFEN Junior Suspension
IRFEN retard RET Film- tabletten (Ibuprofen)	Keine	Nein	Nein	Retardtablette, Retardwirkung geht durch Mörsern verloren	nicht retardierte Form verwenden, Dosisanpassen



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
ISOKET retard RET Tbl (Isosorbid dinitrat)	Keine	Nein	Nein	Retardtablette, Retardwirkung geht durch Mörsern verloren	<i>ISOKET Spray, Sublingual Tabl, Inf Konz 10 mg / ml (nur parenterale Gabe), NITRODERM TTS 5 mg/24h oder 10 mg/24 h, NITROGLYCERIN Kau- tabl., NITROLINGUAL Pumpspray, DEPONIT Mat- rixpfaster</i>
ISONIAZID Tbl Labatec (Isoniazid)	Z / S	Ja	Ja		
ISOPTIN Film Tabl (Verapamil)	Z / S	Ja	Ja		
ISOPTIN retard Ret Filmtabl (Verapamil)	Keine	Nein	Nein		ISOPTIN Film Tabl 80 mg (unretardiert), ISOPTIN Inj Lös (IMP)
ISOPTIN RR retard Ret Filmtabl (Verapamil)	Keine	Ja	Nein	Wirkstoff ist bitter und kann ein leicht betäubendes Gefühl auf der Mundschleimhaut hervorrufen	ISOPTIN Film Tabl 80 mg (unretardiert), ISOPTIN Inj Lös (IMP)
ITINEROL B6 Kps (Meclozin, Coffein, Pyri- doxin)	S	Nein	Ja	suspendierter Kapselinhalt sofort verabreichen. Kapselinhalt ist Mischung aus 3 versch. Pellets (max. Grösse 1 mm). Sondengabe: Mind. CH 12	ITINEROL B6 Supp
JANUVIA Filmtabl (Sitagliptin)	Z / S	(Ja)	Ja		Insulin
JARDIANCE Filmtabl (Empagliflozin)	Z / S	(Ja)	Ja		Insulin
KALCIPOS-D3 Filmtabl (Calcium, Colecalciferol)	Z / S	(Ja)	Ja	Achtung: Phosphat kann zu Komplexbildung führen Wegen Tablettenfilm evtl. Alternative wählen	<i>CALCIUM D3 Brausetabl. Sandoz</i>
KCL RETARD Haus- mann Drag 10 mmol (Kaliumchlorid)	Keine	Nein	Nein	Retardtabletten	KCL Braun Inf 14.9% (säuernd) orale Gabe 1:1 verdünnen, Gabe über Jejunalsonde 1:2 verdünnen, KALIUM HAUSMANN Effervetten (Kaliumci- trat, 30 mmol K+, alkalisierend)
KEPPRA Film Tabl (Levetiracetam)	Z / S	Ja	Ja	Sonde kann durch Pulvermischung verkleben.	KEPPRA Lösung 100mg/ml (Traubengeschmack); KEPPRA Inf
KYTRIL Filmtabl	Z / S	Nein	Ja		GRANISETRON Inf Konz 1 mg oder 3 mg/ml, ONDANSETRON ODT Schmelztabletten 4mg



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
(Granisetron)					
LAMICTAL Disp Tabl (Lamotrigin)	S	Nein	Ja	Tablette ist kau- und dispergierbar. Zubereitung direkt in Spritze, suspendierbar in wenig Wasser (5-10 ml)	
LASIX Tabl (Furosemid)	Z / S	Ja	Ja	Wirkstoff lichtempfindlich: Innerhalb 10 Min. verabreichen. LASIX Inj Lös darf auch per Sonde verabreicht werden (auch jejunal). 40 mg Tabl teilbar in 2 Teile, 500 mg Tabl teilbar in 4 Teile	LASIX Inf Lös 250 mg / 25 ml, LASIX Inj Lös 20 mg / 2 ml
LEPONEX Tabl (Clozapin)	Z / S	Ja	Ja		-
LETROZOL Sandoz Filmtab (Letrozol)	Z / S	(Ja)	Ja	CMR Substanz.	
LEUCOVORIN CAL- CIUM Farnos Tabl (Calcium folinat)	Z / S	(Ja)	Ja		LEUCOVORIN InjLös 50mg/5ml Vial Teva
LEXOTANIL Tabl (Bromazepam)	Z / S	Ja	Ja		
LIORESAL Tabl Tabl (Baclofen)	Z / S	Ja	Ja		-
LITALIR Kaps 500 mg (Hydroxycarbamid)	S	Nein	(Ja)	CMR-Substanz. Sondengabe in Ausnahmefällen möglich	-
MADOPAR Tabl (Levodopa, Benserazid)	Z / S	Ja	Nein	Wirkstoff ist oxidationsempfindlich: Nicht in Fruchtsaft, Milch oder heissen Getränken suspendieren, rasch verabreichen, andere Galeniken bevorzugen	MADOPAR LIQ Tabl
MADOPAR DR Tabl (Levodopa, Benserazid)	Keine	Ja	Nein	Retard Matrix: Dual Release (langsame Freisetzung), Retardfunktion geht durch Mörsern oder suspendieren verloren	MADOPAR LIQ Tabl (schnellerer Wirkungseintritt, höhere Bioverfügbarkeit)
MADOPAR LIQ Tabl (Levodopa, Benserazid)	S	Ja	Ja	nicht in Milch oder Fruchtsaft suspendieren	-
MALARONE Filmtabl (Atovaquon, Proguanil)	Z / S	(Ja)	Ja	Können zermörsert und mit einem Milchgetränk verabreicht werden. Fett verbessert die Absorption. Unmittelbar vor Anwendung zerdrücken und suspendieren.	-



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/ Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
MALTOFER Filmtabl (Eisen III)	Z / S	(Ja)	Ja		MALTOFER Tropfen, MALTOFER Sirup
MARCOUMAR Tabl (Phenprocoumon)	Z / S	Ja	Ja	Wirkungsminderung bei Sondengabe beschrieben; Unterbrechung der Nahrungszufuhr 1h vor und nach Arzneimittelgabe). INR Monitoring Wirkstoff setzt sich in der Suspension stark ab. Gut nachspülen Teilbar in 4 Teile	Heparin sc./iv.
MESTINON Tabl (Pyridostigmin)	Z / S	(Ja)	Ja	Hygroskopisch (Wasseranziehend): Innerhalb 10 Min. verabreichen	
METHADON Streuli Tabl (Methadon)	Z / S	Ja	Ja		<i>METHADON Streuli Tropfen 1%</i>
METOLAZON Galepharm Tabl (Metolazon)	Z / S	Ja	Ja		
METOPROLOL Mepha Depotabs (Metoprolol)	S	Ja	Ja	Nicht mörsern: Eine Depotab mit Mikropellets, Retardwirkung geht durch mörsern verloren. Tabletten können suspendiert werden	
MIANSERIN Mepha Lactab (Mianserin)	Z / S	Ja	Ja		
MIFEGYNE Tabl (Mifepriston)	Z / S	(Ja)	(Ja)	Tabl 200 mg rund, Tabl 600 mg Sonderform	
MIANSERIN Mepha Lactab (Mianserin)	Z / S	Ja	Ja		
MIRTAZAPIN Sandoz Filmtabl (Mirtazapin)	Z / S	Ja	Ja	Schmelztabletten können auf der Zunge oder in Wasser gelöst werden	<i>MIRTAZAPIN Sandoz eco Schmelztabletten</i>
MST CONTINUS Ret Tabl (Morphin)	Keine	Nein	Nein	Matrixtablette, Retardprinzip geht verloren	SEVRE-LONG Kapseln öffnen und suspendieren.



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/ Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
MYAMBUTOL Filmtabl (Ethambutol)	(Z / S)	Ja	Ja	CMR-Substanz. Tabl 100 mg ohne Bruchrille. Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	
NAPROXEN Lacktabl Mepha (Naproxen)	Z / S	Ja	Ja	Wirkstoff ist hydrolyseempfindlich, nach dem Zermörsern sofort verwenden Tabl. 250 mg ohne Bruchrille, Tabl. 500 mg mit Bruchrille	
NEBILET Tabl (Nebivolol)	Z / S	Ja	Ja	Teilbar in 4 Teile (Kreuzbruchrille)	Alternativer Betablocker
NEO-MERCAZOLE Tabl (Carbimazol)	S	Nein	Ja	Tabl suspendierbar in Wasser, nicht zermörsern: Wirkstoff ist hautreizend	-
NEPHROTRANS Kaps (Natriumhydrogencarbonat)	Keine	Nein	Nein	Weichkapsel mit magensaftresistentem Überzug und öligem Inhalt, wird im Dünndarm resorbiert, Lösung kann auch oral verabreicht werden; 1:1 mit Wasser verdünnen (Magensaftresistenz geht verloren)	Natr. Bikarbonat 8.4% Bichsel 10x10ml (1mmol/ml)
NOFIL forte Tabl (Sulfamethoxazol, Trimethoprim)	Z / S	Ja	Ja	Tabl in 10 ml Wasser suspendieren.	NOFIL Sirup Kind
NOVALGIN Tabl (Metamizol)	Z / S	(Ja)	Ja	Wirkstoff instabil: Innerhalb 10 Min. verabreichen	NOVALGIN Tropfen, NOVALGIN Supp, NOVAMIN-SULFON i.v.
NOZINAN Tabl (Levomepromazin)	Z / S	Ja	Ja	Wirkstoff licht- und oxitationsempfindlich: Innerhalb 10 Min. verabreichen	<i>NOZINAN Tropfen</i>
ONDANSETRON ODT Sandoz Schmelztabl (Ondansetron)	S	(Ja)	Ja	Schmelztablette auf Zunge zergehen lassen und schlucken, direkt in der Spritze mit Wasser suspendierbar	<i>ONDANSETRON Sirup, ONDANSETRON i.v. GRANISETRON i.v.</i>
ORFIRIL LONG Ret Kaps (Valproinsäure)	Kapseln öffnen und S	Nein	Ja	Kapselinhalt in mögl. kohlesäurehaltigem Getränk dispergieren oder auf weiche Nahrung streuen Inhalt der Retardkaps quellen leicht, was bei dünnen Sonden zum Verkleben führt.	ORFIRIL Sirup 300mg/5ml (Tagesdosis auf 3-5 Gaben verteilen)



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
ORFIRIL LONG Mini-packs (Valproinsäure)	S	Nein	Ja	Minipacksinhalt in mögl. kohlesäurehaltigem Getränk dispergieren oder auf weiche Nahrung streuen Inhalt der Minipacks (Retard-Minitabletten) quellen leicht, was bei dünnen Sonden zum Verkleben führt. Als Alternative Sirup verwenden.	ORFIRIL Sirup 300mg/5ml (Tagesdosis auf 3-5 Gaben verteilen)
OSPEN Filmtabl (Phenoxyethylpenicillin)	Z / S	Ja	Ja	Wirkstoff ist bitter	OSPEN 400 bzw. 750 Sirup (400000 IE / 5 ml bzw. 750000 IE / 5 ml)
OXYCODON-NA-LOXON Spirig HC Ret Tbl (Oxycodon, Naloxon)	Keine	Ja (nicht: 5 / 2.5mg)	Nein	Retardeffekt geht verloren. Tabletten zu 5 / 2.5 mg sind nicht teilbar, alle übrigen haben eine Bruchrille	OXYNORM Tropfen 10mg/ml oder OXYNORM Schmelztablette (kein Retardeffekt und kein Naloxon)
OXYCONTIN Ret Tabl (Oxycodon)	Keine	Nein	Nein	Retardprinzip geht verloren	OXYNORM Tropfen 10mg/ml oder OXYNORM Schmelztablette (kein Retardeffekt)
PALLADON Kaps (Hydromorphon)	Kapseln öffnen und S	Nein	Ja	Pellets nicht weiter zermörsern, nur in 50 ml Sondennahrung oder Wasser suspendieren; geht schlecht. Sonde mit CH>15 notwendig.	HYDROMORPHON Streuli Tropfen, PALLADON Inj Lös 2mg/ml Amp
PASPERTIN Filmtabl (Metoclopramid)	Z / S	(Ja)	Ja		PRIMPERAN Tropfen, PRIMPERAN Inj Lös 10 mg / 2ml
PAXLOVID Tbl (Ritonavir, Nirmatrelvir)	Z / S	(Ja)	Ja	kann in Apfelsaft oder Joghurt eingerührt werden. Schutzmassnahmen einhalten.	
PERENTEROL Kaps (Saccharomyces Boulardii)	Kapseln öffnen und S	Nein	Ja	nicht in der Nähe vom Patienten öffnen wegen Kontaminationsgefahr	<i>PERENTEROL Piv</i>
PERINDOPRIL Sandoz Tbl (Perindopril)	Z / S	Ja (nur 4mg)	Ja	2 mg und 8 mg ohne Bruchrille	
Phosphat Sandoz Efferveten	L		Ja	Eine Brausetablette kann in ca. 50ml Wasser gelöst und verabreicht werden. Enthält 16.1 mmol Phosphat, 3.1mmol Kalium und 20.4mmol Natrium	KALIUMPHOSPHAT Amp (K:10mmol, P:10mmol) / NATRIUMPHOSPHAT Amp (P: 4.3 mmol, Na: 8.1 mmol)
PLAQUENIL Filmtabl. (Hydroxychloroquin)	Z / S	(Ja)	Ja	Bessere Magenverträglichkeit bei Einnahme mit dem Essen	



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
PLAVIX Tabl (Clopidogrel)	Z / L	(Ja)	Ja	Wirkstoff lichtempfindlich: Innerhalb 10 Min. verabreichen	
PRAVASTATIN Sandoz (Pravastatin)	Z / S	Ja	Ja		
PRAZINE Drag (Promazin)	Z / S	Nein	Ja		NOZINAN Tropfen (Levopromazin)
PREDNISOLON Tbl Streuli (Prednisolon)	Z / S	Ja	Ja		
PREGABALIN Kps Pfizer (Pregabalin)	Kapseln öffnen und S	Nein	Ja		<i>Pregabalin Mepha Lös z um Einnehmen</i>
PRIMPERAN Tabl (Metoclopramid)	Z / S	Ja	Ja		Primperan InjLös, PRIMPERAN Lös
PROBACTIOL Kps (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis)	Kapsel öffnen und S	Nein	Ja		
QUILONORM RETARD Tabl (Lithium)	Z / S	Ja	Ja	Retardprinzip geht verloren, Tagesdosis auf 3 Dosen verteilen uns Lithiumspiegel kontrollieren. CMR-Substanz	
RAMIPRIL Tabl Zentiva (Ramipril)	Z / S	Ja	Ja		
RAMIPRIL HCT Tabl Zentiva (Ramipril, Hydrochlorothiazid)	Z / S	Ja	Ja		
REDORMIN Filmtabletten (Baldrian-und Hopfenextrakt)	Z / S	Ja	Ja		VOGEL Dormeasan Tropfen
RENAGEL Filmtabletten (Sevelamer)	(Z / S)	Nein	(Ja)	Magensaftresistenz geht verloren, Wirkungsverlust wahrscheinlich, Phosphat Spiegel überwachen.	



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/ Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
RIAMET Tabl (Artemether, Lumefantrin)	Z / S	Ja	Ja	Fettreiche Nahrung erhöht Bioverfügbarkeit	<i>RIAMET Dispersible Tabl</i>
RIFATER Drag (Rifampicin, Pyrazinamid, Isoniazid)	Z / S	(Ja)	Ja	CMR Substanz Bei Gabe über Jejunal- oder Duodenalsonde TDM empfehlenswert.	
RIMSTAR Filmtabl (Rifampicin, Pyrazinamid, Ethambutol, Isoniazid)	Z / S	(Ja)	Ja	CMR Substanz Bei Gabe über Jejunal- oder Duodenalsonde TDM empfehlenswert.	
RISPERDAL Tabl (Risperidon)	Z / S	Ja	Ja		<i>RISPERDAL Lösung</i>
RITALIN Tabl (Methylphenidat)	Z / S	Ja	Ja		
RIVOTRIL Tabl (Clonazepam)	Z / S	Ja	Ja	CMR-Substanz	RIVOTRIL Inj Konz, <i>RIVOTRIL Tropfen</i>
ROCALTROL Kps (Calcitriol)	(S)	Nein	(Ja)	Kapsel nicht öffnen (Inhalt halbfest), sondern direkt suspendieren. Löst sich schlecht auf.	
ROHYPNOL Tabl (Flunitrazepam)	Z / L	Ja	Ja		
SALOFALK Filmtabl (Mesalazin)	(Z / L)	Keine	(Ja)	Nur über Jejunalsonde! Magensaftresistenz geht durch Zermörsern verloren.	SALOFALK Supp, SALOFALK Klystier, SALOFALK Granulat, Glucocorticoide systemisch
SANDIMMUN NEORAL Kaps (Ciclosporin)	Keine	Nein	Nein		<i>SANDIMMUN NEORAL Trink Lös, SANDIMMUN Inf Konz</i>
SEQUASE Filmtabl (Quetiapin)	Z / S	(Ja)	Ja	Nur die Filmtab können geteilt oder gemörsert werden, nicht Sequase XR ret.	
SERESTA Tabl (Oxazepam)	Z / S	Ja	Ja		TEMESTA Expidet Tabl (Lorazepam)
SERTRALIN Pfizer FilmTabl (Sertralin)	Z / S	Ja	Ja		<i>ZOLOFT orales Konz Lös 20 mg / ml, SEROPRAM i.v. (Citalopram)</i>



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
SIFROL Tabl (Pramipexol)	Z / S	(Ja)	Ja		
SIFROL ER Ret Tabl (Pramipexol)	Keine	Nein	Nein	Retardwirkung geht durch Zermörsern verloren.	SIFROL Tabl nicht retardiert
SIRDALUD Tabl (Tizanidin)	Z / S	Ja	Ja		
SOLIAN Tabl (Amisulprid)	Z / S	Ja	Ja		<i>SOLIAN Tropfen 100 mg/ml</i>
SPASMO URGENIN NEO Drag (Trospiumchlorid)	Z / S	(Ja)	Ja		<i>KENTERA Matrixpfl</i>
SURMONTIL Tabl (Trimipramin)	Z / S	Ja	Ja	lichtempfindlich	SURMONTIL Tropfen
TAMSULOSIN Sandoz eco RetKps (Tamsulosin)	Kapseln öffnen und S	Nein	Ja	Kapselinhalt aufsuspendieren ohne mörsern.	
TAVANIC Tabl (Levofloxacin)	Z / S	Ja	Ja	Abstand von 2h zu Milchprodukten, Sondennahrung, mineralischen Antacida und anderen Produkten mit Calcium, Zink, Magnesium, Eisen oder Aluminium.	TAVANIC iv. Inf Lös (nur parenterale Gabe)
TAVEGYL Tabl (Clemastin)	Z / S	Ja	Ja	lichtempfindlich	Cetallerg Trpf, TAVEGYL Inj Lös i.v.
TEGRETOL CR Divi- tabs (Carbamazepin)	Keine	Ja	Nein	CMR-Substanz TDM sinnvoll bei veränderter Verabreichung	TEGRETOL Susp 2 % (100mg / 5 ml): Dosierintervall anpassen und bei Verabreichung über Sonde 1:2 verdünnen.
TEMESTA Expidet SchmelzTbl (Lorazepam)	S	Ja	Ja	Können bei Bedarf in nur 5 ml Wasser gelöst werden.	
TEMESTA Tabl (Lorazepam)	Z / S	Ja	Ja		TEMESTA EXPIDET Tabl können in nur 5 ml Wasser gelöst werden



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
TEMGESIC SUBLINGUAL Tabl (Buprenorphin)	Keine	Nein	Nein	Resorption buccal, Tabl unter Zunge vollständig zerfallen lassen (5 -10 min), nicht schlucken oder über Sonde verabreichen	<i>Buprenorphin TTS, TRANSTEC TTS, Fentanyl Inj. Lös</i>
TERBINAFIN Mepha Tbl (Terbinafin)	Z / S	Ja	Ja	lichtempfindlich	
TENORMIN Tabl (Atenolol)	Z / S	Ja	Ja	lichtempfindlich	
THYBON Tbl (Liothyronin; T3)	Z / S	Ja	Ja		
TORASEMID Sandoz eco (Torasemid)	Z / S	Ja	Ja	Torasemid 10 mg und 20 mg: viertelbar	
TOVIAZ Ret Tabl (Fesoterodin)	Keine	Nein	Nein	Retardwirkung geht verloren	Spasmo Urogenin Neo Drg <i>KENTERA Matrixpf</i>
TRAMADOL Mepha Kps (Tramadol)	Kapseln öffnen und S	Nein	Ja	Kaselinhalt kann aufsuspendiert werden. Bessere Alternativen verfügbar.	TRAMADOL Tr oder Supp oder <i>Inj. Lös.</i>
TRAMADOL Mepha ret Depotabs (Tramadol)	Keine	Nein	Nein	Retardwirkung geht durch Zermörsern verloren.	TRAMADOL Tr oder Supp oder <i>Inj. Lös.</i>
TRILEPTAL Filmtabl (Oxcarbazepin)	Z / S	Ja	Ja	CMR Substanz	TRILEPTAL Susp 60 mg/ml
TRITTICO Tabl (Trazodon)	Z / S	Ja	Ja	Säuerlich-bitterer Geschmack	
TRITTICO Ret Tab (Trazodon)	Keine	Ja: 3 Teile	Nein	Retardwirkung geht durch Zermörsern verloren.	TRITTICO Tabl. nicht retardiert
URBANYL Tabl (Clobazam)	Z / S	Ja	Ja		
UROMITEXAN Filmtabl (Mesna)	Z / S	Ja	Ja		UROMITEXAN Inj Lösung (kann auch mit 30ml Wasser verdünnt werden und per os verabreicht)



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
UROREC Kps (Silodosin)	Kapseln öffnen und S	Nein	Ja	Kapselinhalt aufsuspendieren ohne mörsern.	
UTROGESTAN Kaps (Progesteron)	Keine	Nein	Nein	Kapseln können nicht geöffnet werden.	Vaginale Verabreichung
UVAMIN RETARD Kaps (Nitrofurantoin)	Kapseln öffnen und S	Nein	Ja	Kapselinhalt in Wasser aufsuspendieren. Retardeffekt ist aufgrund kristalliner Struktur des Wirkstoff vorhanden.	
VALIUM Tabl (Diazepam)	Z / S	Ja	Ja		Valium im/iv InjLös 10mg/2ml Amp 5ST Diazepam Rectal Tube Desitin
VALTRES Filmtabl (Valaciclovir)	Z / S	(Ja)	Ja	Bitterer Geschmack.	ACICLOVIR TS 250 mg i.v. FOSCAVIR Inf Lös 6000 mg / 250 ml
VENLAFAXIN Pfizer ER Ret Kaps (Venlafaxin)	Kapseln öffnen und S	Nein	Ja	Mikropellets nicht mörsern, Retardwirkung geht sonst verloren. Sonde mit mind. CH12: Kapselinhalt (Mikropellets) in Wasser suspendieren	Nicht retardierte <i>VENLAFAXIN Tabletten</i>
VIBRAMYCIN Tabs Tabl (Doxycyclin)	S	Ja	Ja	Einnahme im Stehen oder Sitzen und 100 ml Flüssigkeit nachtrinken (Magenreizung).	VIBRAVENÖS Inj Lös 100 mg/ 5 ml
VITAMIN B6 Streuli Tabl (Pyridoxin)	Z / S	Ja	Ja		<i>VITAMIN B6 Streuli Inj Lös 100 mg/2ml</i>
VOLTAREN Drag (Diclofenac)	Keine	Nein	Nein		VOLTAREN Supp, Voltaren Tropfen 15mg/ml, VOLTAREN i.v./ i.m.
VORICONAZOL Pfizer Filmtabl (Voriconazol)	Z / S	(Ja)	Ja	CMR-Substanz Bioverfügbarkeit mit Nahrung reduziert, Einnahme 1h +/- Essen, ggf. TDM	<i>VORICONAZOL Pfizer Plv 40 mg / ml zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen</i> VORICONAZOL Pfizer i.v.



Präparat	Zerkleinern	Teilbar	Sondengabe	Problematik/ Empfehlung	Alternativen <i>kursiv Produkte: nicht AML (Sonderbestellung)</i>
XANAX Tabl (Alprazolam)	Z / S	Ja	Ja		VALIUM Inj Lös 10 mg/ 2 ml i.m. / i.v. (Diazepam)
XANAX retard Ret Tabl (Alprazolam)	Keine	Nein	Nein	Retardeffekt geht durch Zerkleinern verloren	XANAX Tabl 0.5 mg (Dosisintervall anpassen)
XARELTO Filmtabl (Rivaroxaban)	Z / S	(Ja)	Ja	Nur über die Magensonde	Niedermolekulare Heparine
Xifaxan Filmtabl (Rifaximin)	Z / S	(Ja)	Ja	Bitterer Geschmack	
ZINAT Filmtabl (Cefuroxim)	Z / S	(Ja)	Ja	Bitterer Geschmack, evtl. mit Fruchtsaft oder kalter Milch mischen. unmittelbar verabreichen, lichtempfindlich	<i>ZINAT Piv 125 mg/ 5 ml f Susp</i>
ZITHROMAX Filmtabl (Azithromycin)	Z / S	(Ja)	Ja	Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	<i>ZITHROMAX Gran 100 mg ZITHROMAX Gran 300 mg ZITHROMAX Piv 200 mg/ 5 ml f Susp</i>
ZOLPIDEM Zentiva Filmtabl (Zolpidem)	Z / S	Ja	Ja		<i>ZOLPIDEM Mepha 10 mg soluble Brausetabletten</i>
ZYLORIC Tabl (Allopurinol)	Z / S	(Ja)	Ja	unmittelbar verabreichen, lichtempfindlich	
ZYPREXA Tabl (Olanzapin)	Z / S	(Ja)	Ja	Wirkstoff ist augen-und schleimhautreizend, unmittelbar verabreichen, lichtempfindlich	<i>ZYPREXA Velotab Schmezztabletten: bioäquivalent, aber keine bez. Resorption über Mundschleimhaut</i>

Disclaimer:

Institut für Spitalpharmazie des Stadtpitals Zürich hat diese Informationen mit grösster Sorgfalt zusammengestellt, es wird jedoch keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernommen.